



专家提出：抗生素「用老不用新」

国家药监局提醒

关注细辛脑注射剂过敏反应

6月10日,国家药品不良反应监测中心发布第38期《药品不良反应信息通报》,国家食品药品监督管理局提醒关注细辛脑注射剂引起的严重过敏反应。细辛脑注射剂的主要成分是天南星科植物石菖蒲的提取物α-细辛脑,剂型包括细辛脑注射液、注射用细辛脑、细辛脑氯化钠注射液三种。临床主要用于肺炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病伴咳嗽、咯痰、喘息等。

国家药品不良反应监测中心病例报告显示,2004年1月1日至2011年2月28日,有关细辛脑注射剂的病例报告数共计5631例,严重病例报告共计710例。尤其是儿童使用细辛脑注射剂后发生过敏性休克、过敏样反应等严重不良反应病例较多。其中,14岁以下的儿童患者达466例,占严重病例

的65.64%,6岁以下儿童严重病例共387例,占全部儿童严重病例的83.05%。主要表现为过敏性休克、过敏样反应、呼吸困难等。

国家药监局建议,医生在处方细辛脑注射剂前应详细询问患者过敏史,对该药所含成分过敏者禁用,过敏体质者慎用,6岁以下儿童慎用。严格按照说明书规定的用法用量给药,避免超剂量使用,尽量单独用药,在给药期间应密切观察,出现胸闷、呼吸困难等早期过敏症状应立即停药或给予适当的救治措施。

建议生产企业完善产品说明书,增加相关安全性信息;加强临床合理用药的宣传,确保产品的安全性信息及传达给患者和医生;并开展上市后安全性研究。(张东风)

射干麻黄汤加味

治疗小儿喘息性支气管炎

射干麻黄汤出自东汉张仲景《金匮要略》,具有宣肺祛痰、下气、止咳、平喘之功效。笔者于临床以此方加味治疗小儿喘息性支气管炎28例,疗效颇佳。

治疗方法 药物组成:射干5-8克,麻黄2克(先煎),

细辛1.5克,紫菀6克,款冬花6克,法半夏6克,五味子5克,生姜8克,大枣6克,地龙5克,甘草3克。若痰多加前胡5克,桔梗5-8克;发热加鱼腥草15克,黄芩4克。水煎服,每天1剂,早晚各服一次,3天为一疗程。治疗期间不使用其他

药物,1~2个疗程后不愈或中途病情加重转中西医结合治疗。疗效判定以《临床疾病诊断依据治愈好转标准》中关于此病治愈好转标准。

结果 治愈21例,好转6例,因心力衰竭转中西医结合治疗1例。(贾丽春)

流行性腮腺炎的辨证治疗

流行性腮腺炎是由腮腺炎病毒引起的急性呼吸道传染病,常在校园或幼儿园中流行,成人及两岁以下小儿很少得病。腮腺炎病毒存在于患者唾液中,经飞沫传播。中医学认为,此病属于温病的范畴,只要辨证正确,及时治疗,预后良好。

临床常见证型包括风热外感型和热毒炽盛型两个类型。

风热外感型 其临床表现与感冒有些相似,症见头痛,低热,多在37.5~38.5摄氏度之间,有的还可见打喷嚏、流涕,腮部肿胀酸痛,进食咀嚼时加重,舌质红,苔薄黄,脉浮数。治宜清热解毒,透表散结。方用薄荷5克(后下),连翘12克,金银花15克,玄参12克,夏枯草15克,虎杖12克,荆芥6克,板蓝根25克,牛蒡子9克,黄芩8克,黄柏6克,甘草6克。加水煎至400毫升,每天分两次温服,连服3~4剂。同时可用新鲜仙人掌去刺,洗净捣烂外敷。若无仙

人掌,也可用蓝靛外敷。

热毒炽盛型 主要表现为腮部胀痛明显,稍微轻触即感疼痛,进食咀嚼均感艰难,咽喉部红肿,大便秘结不畅,小便短赤,舌质红,苔黄厚,脉弦数。治宜清热解毒,消肿散结。方用黄芩12克,黄连8克,黄柏6克,蒲公英32克,马勃4.5克(布包),蒲黄3.3克(布包),夏枯草18克,柴胡6克,玄参12克,牛蒡子10克,甘草6克。加水煎成400毫升,每天分两次温服。每天1剂,连服3天。若肿胀明显,可另服六神丸,成人每次10粒,每天3次,小儿依年龄酌减;大便秘结不通,加大黄8克(后下),硝磺6克(冲服);高热至40摄氏度或以上者加服紫雪丹,每次0.75克,每天两次;如腮部硬肿明显,可于上方加海藻15克(另包,洗去盐分),昆布15克(洗去盐分),外敷药则改用青黛、黄柏粉、大黄粉、梔子粉混合调

成糊状,湿敷患处,以助软坚消肿止痛;小便短少不利者,可于上方加水通6克,篇蓄10克,以利尿排毒;头昏欲睡者,加石菖蒲6克,白僵蚕8克;痰多者,可服三蛇胆川贝末,每天2~3次,每次1克;或上方加浙贝母12克,天竺黄6克;合并暴腮肿痛者,加荔枝核15克,川楝子8克。若发现合并症时,要及时住院治疗。

外治法 青黛适量,以醋调敷于患处,每天3~4次;紫金锭或如意金黄散适量。以水调匀后外敷患处,每天3~4次;将仙人手切薄片外贴患处,每天3~4次;鲜蒲公英、鲜七叶一枝花、鲜马齿苋,任选其中一种,捣烂外敷患处,每天3~4次。

预防 在流行期应避免与腮腺炎患者接触,服用板蓝根颗粒(冲剂)或取中药板蓝根煎液亦可。一岁以上的儿童接种腮腺炎病毒活疫苗,有良好的预防效果。(王海亭)

用药别忘八项注意

遇到碱性小肠液而分解出鞣酸,使蛋白凝固,起到收敛和止泻作用。有些胃炎患者要吃氢氧化铝或复方制剂等,药物在餐前服用可充分地吸附在胃壁上,形成一层保护膜,对胃黏膜有保护作用。促进胃动力的药物也应该在餐前30分钟服用,以利于促进胃蠕动和食物下排空,帮助消化。降血糖药如二甲双胍、格列本脲、格列喆酮等,小剂量在餐前服用疗效高,血浆达到峰值浓度时比餐中服用短。

用餐时与食物同服的药物 助消化药如乳酶生、干酵母、胰酶、淀粉酶等,与食物同服可以发挥酶的助消化作用,并避免被胃液中的酸破坏。降糖药如二甲双

胍、阿卡波糖等,宜餐中服,可减少药物对胃肠道的刺激。非甾体类抗炎药,如吲哚美辛、吡罗昔康、美洛昔康等,与食物同服也避免了对胃黏膜的刺激,并可使药物抗炎止痛效果更持久。

餐后15~30分钟服用的药 一般对胃肠道有刺激的药物,如阿司匹林、保泰松、吲哚美辛、布洛芬、碘化钾、氯化铵、呋喃丙胺、小檗碱等,餐后服用可以避免药物对胃黏膜的刺激。

在睡前服用的药物 催眠类药物要在睡前10~30分钟服用。因哮喘多在凌晨发生,因此平喘药,如沙丁胺醇、氨茶碱等睡前服用止喘效果更好。降血脂药

如洛伐他汀、普伐他汀等也应睡前服用。因为肝脏合成脂肪的峰期多在夜间,睡前服用有助于提高疗效。

不能嚼碎服用的药物 许多药物在胃液的酸性条件下不稳定,容易分解失效或对胃黏膜有刺激,还有的药只有在小肠中才能吸收,例如肠溶性阿司匹林。还有一些控释片,是在普通药片外层包被一层半透膜。当药片进入胃内后,胃液可通过半透膜进入药片内溶解部分药物,药物溶液通过膜上小孔缓慢释放而发挥治疗作用。若嚼碎了服用,会破坏半透膜,不能起到缓慢释放和对胃黏膜保护的作用。

不宜用热水送服的药物

助消化药如胃酶合剂、胰蛋白酶、双歧杆菌等的主要成分多是酶、活性蛋白质或益生菌,受热后即凝固变性而失去作用,达不到助消化的目的。维生素类药物如维生素C、维生素B₁、维生素B₂等,受热后易还原破坏而失去药效。止咳糖浆类药物,糖浆多为复方制剂,若用热水冲服,会稀释药液,降低黏稠度而影响疗效。

吃后要多喝水的药物 利胆药能促进胆汁分泌和排出,有助于胆道内的泥沙样结石和少量其他结石排出。但有些利胆药可引起胆汁过度分泌和腹泻,因此应尽量少饮水。抗感染药物如磺胺类药物、氨基苷类药物大多经肾脏排泄,高浓度时对肾脏有毒害作用,还可以形成结晶。大量饮水,碱化尿液,可促进结晶溶解排出,也可加速药物排泄出体外。(张传生)

骨关节炎选哪些药



乙酰氨基酚副作用小,但止痛效果相对弱些,主要用于轻、中度疼痛;曲马多止痛效果较强,但副作用也较大,主要为胃肠道副作用,如恶心、呕吐等。

二、非甾体类抗炎药 同时具有消炎和止痛作用,适合炎症性疼痛,对于骨关节炎急性期、关节肿胀的患者缓解症状效果较好。这类药物可能会导致恶心、呕吐等消化道不适,还会增加消化道出血风险。因此,胃十二指肠溃疡患者在应用这类药物时应加用胃黏膜保护药物或抑酸药物。

局部涂抹药膏或贴膏药 与止痛药物类似,也是缓解症状,不能延缓骨关节炎的进展。但由于是局部应用,与

药物可引发酒精中毒

河南省肿瘤医院 林晓贞 陈小兵

夏日将至,人们街头豪饮的热情也越来越高,时下也常有报道酒量很大的某位先生,随意抿了几口酒就出现酒精中毒,送至医院抢救的事例,究其原因还是饮酒前应用了头孢菌素类抗生素引发了双硫仑样反应。

双硫仑又称双硫醒、戒酒硫等,用于戒酒治疗。双硫仑样反应是由于应用结构与双硫仑类似的药物后饮用含有乙醇(酒精)的饮品(或接触乙醇)导致的体内“乙醛蓄积”的中毒反应。

引起双硫仑样反应的药物有头孢菌素类抗生素如头孢哌酮、头孢唑啉、头孢噻肟、甲硝唑、替硝唑、酮康唑、呋喃唑酮、氯霉素、酮康唑、灰黄霉素、磺胺类、甲苯磺丁脲、格列本脲、苯乙双胍、阿米替林、水合氯醛、奥美拉唑、华法林、氯丙嗪、三氟拉嗪、妥拉苏林、胰岛素、异烟肼、硝酸甘油、硝酸异山梨酯、苯海拉明、巴比妥类药物等均可引起双硫仑样反应。国内报道药物引起的双硫仑样反应以头孢菌素类最多,其中头孢哌酮位居榜首,其次是呋喃唑酮和甲硝唑。

上述药物抑制肝脏里的乙醛脱氢酶,体内乙醇的解毒主要靠乙醛脱氢酶,酶的水平高意味着解酒功能强。应用上述药物之后,乙醛脱氢酶的功能将被抑制,使得乙醇在人体内氧化为乙醛后不能再继续氧化分解,从而导致乙醛在体内蓄积,引起乙醛中毒反应。

临床表现: 用药期间或停药后短期内饮酒(或接触酒精),多数在5分钟~1小时内出现双硫仑样反应,表现为恶心、呕吐、头痛、眼花、失眠、多汗、四肢乏力、面部潮红、喉头



射干麻黄汤加味

射干麻黄汤出自东汉张仲景《金匮要略》,具有宣肺祛痰、下气、止咳、平喘之功效。笔者于临床以此方加味治疗小儿喘息性支气管炎28例,疗效颇佳。

治疗方法 药物组成:射干5-8克,麻黄2克(先煎),

遗失声明

河南省西平县医院秦金执业
医师证(证号:11041000025889)不慎丢失,声明原件及其复印件作废。

声明

新密市人口和计划生育医院张玉红医师资格证(证号:200941110410126197309053766)已找到,原刊登本报的遗失声明作废,特此声明。

无锡维康科仪有限公司

生产许可证:苏食药监械生产许2004-006号
注册证号:苏食药监械(准)字2010第320803号
WK-R 超声雾化吸入器(由细胞分析仪),参考价135万元/台至235万元/台;检测项目:细胞凋亡、红细胞、血红蛋白、血小板等;分类:八类,二十一型,适用于临床血液检测;参考价5500元/台;超声雾化吸入器(由细胞分析仪),参考价135万元/台;检测项目:细胞凋亡、红细胞、血红蛋白、血小板等;分类:八类,二十一型,适用于临床血液检测;参考价5500元/台;超声雾化吸入器(由细胞分析仪),参考价135万元/台;检测项目:细胞凋亡、红细胞、血红蛋白、血小板等;分类:八类,二十一型,适用于临床血液检测;参考价5500元/台。

欧洲产品质量领袖奖 开立彩超

一、荣获国家质量监督检验检疫总局“中国名牌产品”称号。
二、2009年被评为“国家级高新技术企业”。
三、国内首家获得4D彩超注册证,技术领先。
四、产品批出口全球110多个国家和地区。
五、价格低,24小时售后服务,保修期两年。
河南办事处:(0371)63219614
联系人:申洪亮 15343810076

壮医、中医培训招生

广西民族大学研究院(广西壮医学院),是国家卫生部授权负责组织实施执业医师资格考试的单位,办学宗旨是:推广民族医药科研成果,传授特色诊疗技术,为社会培养人才(任何人都可报名参加学习)。

壮医、中医诊疗技术培训班:7月13日开学(12日报到),学习15天。学习:壮医总论、壮药知识、壮医目诊、壮医经筋疗法、壮医药线疗法、壮医刺血疗法、壮医刮痧排毒疗法、壮医药罐疗法、火攻疗法、中医基础理论、中药学、方剂学、经络腧穴、针灸、推拿按摩、常见病的诊断治疗。有医院供学员见习实习。学后盖盖有公章钢印的证书,证书作为开展工作和壮医医师考试的凭证,并免费推荐工作。

联系人:付小珍 刘宁 电话:0771-3934925(办) 13257786688
网址: http://www.gxminzuzyy.net/
地址:广西民族大学研究院培训部(广西南宁市明秀东路234号)

洛阳市平乐正骨学校 面向全国招生

(学校代码 420)

平乐郭氏正骨,迄今200余年,是中医正骨的主要学派,蜚声国内外。本校以传授平乐正骨医术为特色,创办23年来为全国培养了数千名正骨人才。学校设有普通中专和“3+2”大专两种学制,开设中医正骨、中药、药剂、卫生保健、针灸推拿等专业。国家承认学历,符合条件的学生可享受国家助学金。具有初中毕业以上学历者可报名参加,对能胜任工作的毕业生,学校负责推荐就业。欢迎有志于骨伤医学的学子到校就读。

另需骨科人才的医院、单位请与我校联系。

校长:郭宏涛
咨询电话:(0379)67812333 67815234
18937991345
传真:(0379)67815234
网址: www.plzhenggu.com
邮箱: plgk@hotmail.com
地址: 河南省洛阳市东郊平乐镇

全国浮针疗法临床示范推广培训中心 第145届疼痛高级研修班河南招生通知

一、浮针疗法突破传统针灸理论,学习无需经络穴位基础,是一种操作简便、相对易学的新疗法,针对在局限性疼痛特定的位置行皮下组织散打以治疗疼痛(1-2分钟解除或减轻疼痛)。近年来,浮针疗法在国内推广,发展迅速,因简便、广泛、安全的特点,成为医院和个体诊所治疗疼痛的普及疗法。经6万多例临床应用,其有效率达100%,康复率达90%以上。由于取效快捷,常用于麻醉、北美被誉为“神针”。“一针在手,走遍神州”,可随时随地解决疼痛问题。该疗法曾荣获第一军医大学“九五”科技成果、中国人民解放军优秀医疗成果二等奖,世界国际科技进步二等奖,世界中医学会特等奖。

主治:颈椎病、腰椎间盘突出、腰三横突综合征、腰肌劳损、扭伤、骨质增生、肩周炎、风湿、类风湿性关节炎、神经痛、三叉神经痛、头痛、失眠、网球肘、腱鞘炎、强直性脊柱炎、梨状肌综合征、带状疱疹、乳腺炎、癌性疼痛、结石疼痛、胃痛、胆囊炎、阑尾炎等各种疼痛疾病及妇科炎症。

二、踝三针治疗腰间盘突出的。
三、特效彩色、无铅膏药的制作新技术,操作简单,无烟无毒、无异味,全过程只需十几分钟。
费用900元,发结业证(自备1寸照片两张)。
无:太极拳针疗法(神穴治百病)温经活血、祛寒止痛,开阳除阴,补虚固脱。
报名时间:7月14日 培训时间:7月15-16日
报名地点:郑州市纬五路45号附1号河南省医学会602室
联系人:侯主任(0371)61218030 18637156665
中心网址: www.fuzhenwang.cn/