责编 杨小沛

美编 朱忱飞

急

合理用药



"今天不行动,明天没药 用!"这不是危言耸听,这是世界 卫生组织就抗菌药物滥用发出 的呼吁。抗菌药物是医院里使 用最频繁的药物。安全、有效、 医务工作者应该做到的事情。

#### 诊断为细菌性感染者 方有指征应用抗菌药物

根据患者的症状、体征,实验 室检查或放射、超声等影像学结 果,被诊断为细菌、真菌感染者方

药热敷治急

有指征应用抗菌药物;由结核杆 菌、非结核杆菌、支原体、衣原体、 螺旋体、立克次体及部分原虫等 病原微生物所致的感染亦有指征 应用抗菌药物。缺乏细菌及上述 经济地使用抗菌药物,是每一位 病原微生物感染的临床或实验室 证据,诊断不能成立者,以及病毒 性感染者,均无应用抗菌药物指 患者,应根据经验治疗的效果和患

#### 根据病原菌及药敏结果 选用合适的抗菌药物

原则上应根据病原菌种类及

# 科学使用抗菌药物

义马市人民医院 刘小丽

病原菌对抗菌药物敏感性,即细 菌药物敏感试验(以下简称药敏 试验)的结果而定。因此,有条件 的医疗机构,对临床诊断为细菌 性感染的患者,应在开始抗菌治 药物。 疗前,及时留取相应合格标本(尤 其血液等无菌部位标本)进行病 原学检测,以尽早明确病原菌和 药敏结果,并据此调整抗菌药物 治疗方案。

#### 抗菌药物的经验治疗

对于临床诊断为细菌性感染 的患者,在未获知细菌培养及药敏 结果前,或无法获取培养标本时, 可根据患者的感染部位、基础疾 病、发病情况、发病场所、既往抗菌 药物用药史及其治疗反应等推测 可能的病原体,并结合当地细菌耐 药性监测数据,先给予抗菌药物经 验治疗。待获知病原学检测及药 敏结果后,结合先前的治疗反应调 整用药方案。对培养结果阴性的 者情况,采取进一步诊疗措施。

#### 按照药物的药学特点 正确选用抗菌药物

各种抗菌药物的药效学和 大(治疗剂量范围高限);而治疗

人体药动学特点不同,因此各有 不同的临床适应证。临床医师 应根据各种抗菌药物的药学特 点,按临床适应证正确选用抗菌

### 结合实际确定抗菌治疗方案

根据病原菌、感染部位、感染 严重程度和患者的生理、病理情 况,以及抗菌药物药效学和药动 学证据,确定抗菌治疗方案,包括 抗菌药物的选用品种、给药剂量、 给药次数、给药途径、疗程及联合 用药等。在确定治疗方案时,应 遵循下列原则。

一、品种选择。根据病原菌 种类及药敏试验结果,尽可能选 择针对性强、窄谱、安全、价格适 当的抗菌药物。进行经验治疗者 可根据可能的病原菌及当地耐药 状况选用抗菌药物。

二、给药剂量。一般按各种 抗菌药物的治疗剂量范围给药。 治疗重症感染(如血流感染、感染 性心内膜炎等)和抗菌药物不易 达到的部位的感染(如中枢神经 系统感染等),抗菌药物剂量宜较

单纯性下尿路感染时,由于多数 药物尿药浓度远高于血药浓度, 则可应用较小剂量(治疗剂量范

三、给药途径。对于轻中度 感染的大多数患者,应给予口服 治疗。选取口服吸收良好的抗菌 药物品种,不必采用静脉或肌内 注射给药。

四、给药次数。为了保证药 物在体内能发挥最大药效,杀灭 感染灶病原菌,应根据药动学和 药效学相结合的原则给药。青 霉素类、头孢菌素类和其他β-内 酰胺类、红霉素、克林霉素等时 间依赖性抗菌药,应一日多次给 药。氟喹诺酮类和氨基糖苷类 等浓度依赖性抗菌药可一日给

五、疗程。抗菌药物疗程因 感染不同而异,一般宜用至体温 正常、症状消退后72~96小时。 有局部病灶者需用药至感染灶控 制或完全消散,但感染性心内膜 炎、化脓性脑膜炎、伤寒、骨髓炎、 B组链球菌咽炎和扁桃体炎、侵 袭性真菌病、结核病等患者,需要 较长的疗程方能彻底治愈,并且 可以减少或防止复发。

### 本期医生简介:

王广义,在原阳县齐街镇李辛庄村卫生 室工作,执业助理医师,从医15年,擅长治疗 化脓性中耳炎、鼻炎、鼻窦炎、小儿腹泻等, 效果显著。

电话:18790680414

急性化脓性中耳炎经常忽然发作,导致 耳痛、发热,患者多为幼儿。听力减退等症 状可随病程加重,但有时鼓膜穿孔以后听力 会暂时好转,耳痛减轻,脓液流出,常为黏液 脓性。

慢性化脓性中耳炎以单纯型最多见,耳 流脓为间断性,其发作与上呼吸道感染和耳 内误进污水有关;其次是坏死型和胆脂瘤 型,一般需要手术治疗。该方法只针对单纯 型的,治法如下。

急性化脓性中耳炎的治疗,在鼓膜没有 穿孔剧痛的时候,在患者耳道局部放药物纱 条,一天换一次;并让患者口服阿莫西林胶 囊或者罗红霉素分散片,服药3天。如果鼓 膜已经穿孔,用双氧水清洗耳道脓液,洗净 以后用棉签醮净耳道内的双氧水,把做好的 纱条放进耳道靠近鼓膜穿孔部位即可。纱 条一天换一次,一般3天治愈。

慢性化脓性中耳炎的治疗方法同上。 要注意提醒患者预防上呼吸道感染,洗澡、 洗头时用棉花或者香烟的海绵嘴把外耳道 堵住,可以有效预防污水进入耳道。

药物纱条的做法:将纱布块剪开折叠成 大概0.5厘米×2厘米长的小纱条,取曲安奈 德针一支、林可霉素针一支、75%的酒精一毫 升等。把上述药液放在一个瓶子里面,把做 好的纱条放进去备用即可。

慢 □ 王

欢迎您在本栏目分享您的临床技术、经验、用药方法, 甚至"绝招儿"。文章只讲实招儿无须理论,一定要真实有 效。请写清楚您的地址及联系方式。欢迎踊跃参与,积极 投稿

投稿邮箱:343200130@qq.com 联系电话:(0371)85967338

## 警惕流行性出血热 农忙时节

□乔晓娜 张晓茜 方 圆

农忙时节,也是鼠类肆虐出 没之时,应警惕一种以虫、鼠为主 要传染源的自然疫源性疾病,即 流行性出血热。

6月12日,家住邓州市罗营 村64岁的窦先生,突发高热,浑 身无力,当即被送往南阳市中 心医院。

行性出血热。因其家里储有大 化治疗。 量小麦,屋里虫、鼠也随之增 多。窦先生说,他经常食用屋里 一些未封口的干粮和剩饭,有时 候吃的馒头上还带有老鼠屎。直 到出现恶心呕吐、高热不退等症 状,窦先生也没想到罪魁祸首竟 种虫媒传播性疾病。其主要是因 血热患者,应让其休息,注意隔 是自家屋里的老鼠。

人住感染科的窦先生当时已 出现急性肾衰竭,进行床旁血液 净化治疗后,病情已有好转,并于 近日转为普通透析。

6月15日,南阳市中心医院 感染科又收治两名流行性出血 热患者。他们都因食用鼠类及 其排泄物接触过的食物而出现 经诊断,窦先生患的是流 类似症状,目前正在进行血液净

> 科主任刘新宇介绍,他们每年都 会接诊几例重症流行性出血热患 者。该病发病急,肝肾等器官预 后差,病死率达20%~70%,是一 汉坦病毒进入人体后引起的,并 离,早治疗。

可导致休克、出血、急性肾衰竭等 严重病症。

如何预防流行性出血热 呢? 刘新宇说,灭鼠、灭虫应为 首要措施。另外,基层医务工作 者应提醒居民,食物应密封保 存,剩饭要加热烹饪后再食用, 居住环境应保持干净卫生,避免 接触到虫、鼠类及其血液、体液、 粪便等排泄物;户外劳作时应穿 据南阳市中心医院血液净化 袜子,扎紧裤腿,防止蚊虫叮

> 此外,注射流行性出血热疫 苗,也是预防流行性出血热的主 要手段之一。若发现流行性出



实用验方

## 治疗菌痢肠炎验方

治疗疔疮验方

紫花地丁50克,黄柏30 部位多,可加用内服药。取

1剂,饭后温服。

克,水煎,待冷却后,涂擦患 紫花地丁20克,黄柏10克,

病部位,每日三五次。一般 金银花15克,水煎服,每日

新鲜马齿苋 750~1000 著。 克,洗净后捣烂挤出其汁水 150毫升左右。每天服3次, 齿苋鲜汁或煎液保留灌肠, 每次服50毫升,连服5~7每次200毫升,每天1次。 天。对急慢性泻痢,效果卓

三五天疔肿消退。

若疔疮面积较大,患病

对顽固病例,还可用马 (张红旗)

(梅松政)

# 随意乱吃感冒药可造成肝肾损害

本报记者 卜俊成 通讯员 李艳华

"感冒看起来是小病,但是也 话,经医院急诊科抢救,柴先生 不能乱吃药。如果乱吃药,很可 才得以脱险。 能导致肝脏和肾脏损害,还有可 民医院,谈起感冒后的用药安全, 状。事实上,患者随意服用两种 主治医师魏林安忧心忡忡。

症状后,像往常一样到小区附近 状,还容易造成肝脏和肾脏的损 的药店买来几种止痛、止咳和清 害,引发其他疾病。 热的感冒药,在照药品说明书服 冒虚汗,突然昏厥"等症状。幸 酚等成分。过量服用对乙酰氨基 人感冒后,应在医生指导下用 属医院、河南中医药大学多家附属 亏家人及时拨打了120急救电 酚有导致严重肝脏损害的风险。 药。最后,户外作业人群感冒后 医院等医疗机构临床试验,对于普

长时间被冷风(空调、电扇之风)吹拂,或久卧阴冷潮

此病多因吹风受凉后,局部血管痉挛、肿胀、受压

处方:当归20克,川芎30克,黄芪30克,白附子10克,

用法:将上述药置砂锅内,加水3000~5000毫升,浸

此药可益气固表、祛风散寒、温经活络,对受凉受风

迫,造成神经缺血而致。此病起病急骤,应及时救治。

僵蚕10克,蜈蚣2条,全蝎10克,红花30克,丹参30克,秦

泡15分钟,文火煮沸6~8分钟。将药液倒入盆内,待药

液温度降至不烫,用毛巾蘸药液热敷患处面颊(歪左敷

右侧, 歪右敷左侧)。药液可随时加温, 每次热敷 40~60

湿之处,极易引发急性面瘫。面瘫也称急性面神经炎。

用中药逐邪牵正汤热敷治疗此病,收效快,效果好。

艽20克,防风20克,桂枝20克,细辛6克。

分钟,每天2次。每剂药可反复使用四五天。

引起的面瘫有很好的治疗作用。

以上的药物,很容易出现药物协

毒素和废物的器官,体内代谢产 用的感冒药。 魏林安说,很多人感冒后的 物大多通过肾脏由尿液排出。过 能导致昏厥等症状。然而在日常 做法和柴先生一样,误认为几种 量服用含有对乙酰氨基酚等成分 可以选择服用由河南信心药业 饮食应清淡稀软、易于消化吸收, 生活中,感冒后自行服药的人还感冒药一起吃,会在短时间内退的解热镇痛药,还可能造成肾脏有限公司研制生产的感冒舒颗宜少量多餐;及时补充水分,以加

(魏良)

急性间质性肾炎和血尿等。 前不久,家住郑州市的柴先 同反应、叠加效应等不良反应, 呢?魏林安表示,人们首先可以 风清热和发表宣肺的功效,众药 生出现头痛、咳嗽、发热等感冒 进而导致胃肠道出血、昏厥等症 根据自己的症状选择药物,比如 合用,能清风解毒、透表驱邪,并 解热、镇痛作用的感冒药。其菌具有较好的抑制作用。 比如,感冒最常用的非抗炎 次,要根据生理特征选择药物。 药后,很快就出现"脸色苍白,直 解热镇痛药,常含有对乙酰氨基 儿童、孕妇、哺乳期妇女以及老 河南省人民医院、郑州大学第二附

其实,在感冒初期,人们还 不少。"近日,在郑州市第十五人 热,以及缓解头痛、咳嗽等症 损害,严重时可引起急性肾衰竭、 粒。该药主要成分为大青叶、连 翘、荆芥、防风、薄荷、牛蒡子、桔 那么,该如何选择感冒药梗、白芷、甘草等,具有良好的疏 头痛发热时,可以选择一种具有 对引发上呼吸道感染的病毒、细

临床中,信心牌感冒舒颗粒经

众所周知,肾脏是负责排泄 应该尽量避免服用有嗜睡副作 通感冒和流行性感冒的初期治疗, 有利于缩短治疗时间。

此外,魏林安提醒,感冒患者 速代谢物的排泄;多吃富含钙、锌 元素及维生素的食物。如果用药 后5~7天症状仍未缓解,甚至加 重,应及时到正规医院就诊。



# 世界中医药学会联合会举办 第二届国际中医多功能套针发展论坛

准,在民政部门登记注册,总部举办了560余人参加的第一届学今年7月举办培训班730余届,培能:新型浮针、埋线、电套针、套日的学习费用为3380元,免交会 设在北京的国际性学术组织。术年会及成立大会。 现任主席是原中华人民共和国 卫生部副部长、原中国中医药管 建设,促进学术交流,世界中医 理局局长佘靖,创会副主席兼秘 药学会联合会套针专业委员会 传统针灸经络理论,学习无需经 型颈椎病、腰椎病、椎间盘突出 联合会套针专业委员会。 书长由国家中医药管理局原副 第二届国际多功能套针发展论 络穴位基础,操作简便,易学,安 症、骨质增生症、腰三横突综合 局长李振吉先生担任。现任秘 坛将于2017年9月9~10日在郑 全、速效。针具在疼痛特定的部 征、腰肌劳损、腰扭伤、强直性脊 附属护国寺中医医院,北京世界 书长由国家中医药管理局政策州大酒店举办。 法规司司长桑滨生先生担任。

委员会本着学术创新的办会宗 法,并进行现场比赛。 旨,为多功能套针领域的临床应

为了加强多功能套针学科 为广大患者解除了痛苦。

世界中医药学会联合会套针 院士石学敏将讲授醒脑开窍法、 失或减轻)。对使用药物与其他 专业委员会由多功能套针发明人 脑血管后遗症的治疗等。国家 疗法都无效的部分顽症有奇 跟痛、骶髂关节炎、胃痛、胆囊 侯国文担任会长,解放军总医院 中医药管理局领导及世界中医 效。套针治疗时无传统针灸的 炎、痛经、妇科炎症、急慢性阑尾 日。 周章玲担任常务副会长,北京中 药学会联合会领导及河南省卫 酸、麻、胀、痛的针感,以完全无 炎、乳腺炎、带状疱疹、各种结石 医药大学附属护国寺中医医院周 生计生委领导将参会,国内外专 痛为最佳。医生易于掌握,病人 疼痛、癌症疼痛以及心脑血管疾 炜担任秘书长兼副会长。该专业 家将交流多功能套针及各种针 乐于接受。该疗法系一项特色 病等慢性病。

多功能皮下套管针被国家中 词称:"多功能套针学,中医针灸 药卫生报》报到优惠300元,颁世 雅慧

是经中华人民共和国国务院批 术交流平台,2016年在北京成功 为高新适宜技术推广项目,截至 养学员3万余人,遍布世界各地, 针通、水针、刺血、腕踝针,综合 议费。参会者食宿自理。住宿

> 三、多功能套针特点:突破 位皮下组织弧形摇摆后接套针柱炎、风湿性及类风湿关节炎、针联套针中医研究院。 二、国医大师、中国工程院 通以治疗疼痛(一两分钟疼痛消 特效治疗新技术,石学敏院士题

治疗不易复发。

五、多功能套针适应证:各 头痛头晕、三叉神经痛、网球肘、 腱鞘炎、肩周炎、多种关节炎、足 车站前(郑州大酒店)。

六、会议费用1800元,带《医

界中医药学会联合会会员、理 四、多功能套针包含7项功 事、常务理事证书。参加9月11 标准:标间200元/间,100元/人。

主办机构:世界中医药学会 承办机构:北京中医药大学

大会地点:河南省郑州市火

大会时间:2017年9月9~10

参加学习时间:9~11日3天。 电话:(010)87194685

15738301380 联系人:王蒙 杨艳琳 岳

(0371)63687189

## 治疗蚊虫叮咬验方





待冷,涂擦蚊虫叮咬部位。

紫花地丁30克,白花蛇 述药水中加入林可霉素注射 舌草30克,蝉蜕10克,水煎 液60毫克,涂擦患病部位, 每日2次,一般三五天痊愈。 (梅松政)

伴有感染成痈者,在上

本版图片均为资料图片

为了更好地为基层医生的日常诊疗工作提供帮助,本 版对内容进行了调整,设置了《专家连线》《实用验方》《误诊 误治》《经验之谈》《临床提醒》《急救技巧》等栏目。请您关 注,并提供稿件或建议。

投稿邮箱:343200130@qq.com

联系电话:(0371)85967338

来信地址:郑州市郑东新区博学路与学理路交叉口向东

30米医药卫生报社