

小儿泄泻的病因病机

障碍)者,禁用血府逐瘀汤;月经期妇女(尤其是月经量过多者),应慎用或停用血府逐瘀汤。

药物相互作用 血府逐瘀汤要避免与抗凝类(如华法林、阿司匹林、氯吡格雷等)、抗血小板药物、溶栓药物联用;如果必须药物联用,需要在医生严密监测下进行,并及时调整药物剂量。血府逐瘀汤不要与非甾体抗炎类药物长期大剂量联用,避免增加胃肠道出血风险。

特殊人群 儿童慎用血府逐瘀汤,确实需要使用时应严格按照医嘱减少剂量;体质虚弱者,应慎用血府逐瘀汤,必须使用时要调整剂量,监测有无出血倾向;哺乳期妇女,应慎用血府逐瘀汤。

不良反应 患者服用血府逐瘀汤后,胃肠道反应(如恶心、胃脘不适、腹泻等)较为常见。患者在饭后服用血府逐瘀汤,或者

征 稿

投稿邮箱:xulin.lin@qq.com

配伍陈皮、砂仁,可减少胃肠道反应。少数患者服用血府逐瘀汤,可能引起月经期过多或经期延长(尤其是在月经期不当使用血府逐瘀汤时)。长期大剂量服用血府逐瘀汤,需要警惕潜在的凝血功能异常。过敏体质者服用血府逐瘀汤可能出现皮疹等过敏反应。

血府逐瘀汤以“活血化瘀、行气止痛”立论,其“气血同治、升降有序”的配伍思想,使其在现代医学领域(尤其是在微循环障碍、血栓性疾病、慢性疼痛及身心疾病的治疗中)展现出广阔的应用前景。

临床应用血府逐瘀汤须紧扣瘀病机,明辨虚实寒热,合理选择剂型与疗程。随着对活血化瘀机制(如血管新生、炎症网络调控、代谢组学)的深入研究,血府逐瘀汤在精准医疗时代有望焕发新的生机。

(作者供职于河南省人民医院)